



PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES «RESPIRATOIRE»

en établissements de santé et en établissements médico-sociaux

G => GOUTTELETTES : grippe, SARS-CoV-2, VRS, angine, scarlatine, rubéole, coqueluche, méningocoque, bronchiolite, ...

A => AIR : MERS-CoV, rougeole, SRAS, tuberculose pulmonaire, varicelle, lèpre tuberculoïde, ...

se protéger et protéger

pour prévenir une exposition à un liquide biologique après une exposition à un liquide biologique*

prévenir la transmission croisée et le risque épidémique

INFORMER
(dossier, EOH, patient/résident, ...)

ORGANISER LES SOINS

CHAMBRE SEULE de préférence en pression d'air négative
PORTE FERMEE avec ventilation suffisante (6 volumes/h sans recyclage) ou aération régulière

MATERIELS INDIVIDUALISES

LIMITER LES VISITES



FRICION **



PORT DES GANTS



Masque chirurgical




Appareil de Protection Respiratoire APR (FFP2 ou FFP3)



TABLIER LUNETTES



MATERIELS SURFACES LINGE DECHETS PRELEVEMENTS



GESTION DES EXCRETA

SYSTEMATIQUEMENT

SYSTEMATIQUEMENT

SYSTEMATIQUEMENT

SYSTEMATIQUEMENT

SYSTEMATIQUEMENT

SYSTEMATIQUEMENT

Immédiatement après retrait des protections : gants, masque, tablier

si risque de blessure ou de contact avec le sang ou un liquide biologique, une muqueuse, la peau lésée

► **PORTER UN APR**
- **SI RISQUE A** : avant d'entrer dans la chambre, même si patient absent; vérifier l'étanchéité de l'APR (FIT CHECK); ôter l'APR après la sortie de la chambre, une fois la porte fermée
- **SI RISQUE G** + risque d'aérosolisation des sécrétions respiratoires (intubation, extubation, kiné. respiratoire, aspiration, soins mortuaires,...)

► **PORTER UN MASQUE CHIRURGICAL si risque G**, dès l'entrée dans la chambre, y compris pour le bionettoyage de la chambre si patient présent

► **PORTER UN MASQUE CHIRURGICAL si** infection rhino-pharyngée(soignant, visiteurs)

► **LE PATIENT PORTE UN MASQUE CHIRURGICAL** dès qu'il sort de sa chambre

► **CHANGER REGULIEREMENT DE MASQUE (selon reco. fabricant) et systématiquement entre 2 patients/résidents**

si risque de contact avec le sang ou un liquide biologique par projection ou aérosolisation

► **UTILISER** des matériels à USAGE UNIQUE

► **PORTER** des lunettes de sécurité

► **PORTER un tablier imperméable** à UU lors de tout soin souillant ou mouillant

► **PORTER UNE SURBLOUSE IMPERMEABLE MANCHES LONGUES** à UU (à défaut surblouse UU + tablier plastique UU) **SI RISQUE MAJEUR D'EXPOSITION**

► **CHANGER DE TABLIER** entre 2 patients/résidents

► **RETIRER LE/LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION** dès qu'ils ne sont plus nécessaires

► immédiatement après usage **DEPOSER LES MATERIELS A UU DANS UN CONTENEUR ADAPTE**
► **NE PAS** manipuler, recapuchonner ni désadapter à la main les aiguilles
► **TRANSPORT DU LINGE, DES DECHETS ET DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES** dans des emballages fermés et étanches

► **DECONTAMINER LES MATERIELS RE-UTILISABLES** avec un produit détergent-désinfectant

► **SURFACES SOUILLEES : IMMEDIATEMENT APRES SOUILLURE, NETTOYER** avec un détergent puis **DESINFECTER** avec un produit désinfectant

► **ELIMINATION DES DECHETS en filière DASRI**

► **BIONETTOYAGE QUOTIDIEN DES SURFACES HAUTES** avec produit détergent-désinfectant adapté

► **MANIPULER** les bassins et urinaux avec des gants et un tablier plastique à UU
► **ACHEMINEMENT PROTEGEE** (couvercle ou sac) vers local dédié
► Si lave bassin, **le bassin est déposé plein**

► **DESINFECTER** le bassin avec détergent-désinfectant après utilisation de dispositif à usage unique (protecteurs de bassins UU,...)

► **EVITER** les procédures manuelles de vidanges et d'entretien des contenants et **PROSCRIRE** leur rinçage (ni douche, ni douchette) en raison du risque d'aérosolisation

REFERENCES

MESURES SPECIFIQUES G

MESURES SPECIFIQUES A

- Prévenir la transmission croisée. 04/2009, SFHH;
- Surveiller et Prévenir les IAS, 09/2010, SF2H /HCSP;
- Actualisation des précautions standard, 06/2017 SF2H ;
- Circulaire DGS n°2008/91 du 13/3/2008; Arrêté du 10/7/2013.

- * Exposition sans contact percutané (piqûre, coupure) ni muqueux (œil, bouche) ni sur peau lésée (eczéma, plaie) avec du sang ou un produit biologique ;
- ** FRICTION à remplacer par lavage des mains si les mains sont visuellement sales, souillées, humides, mouillées, lésées ou poudrées