


LILY

PRÉVENIR LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES COURTS ET SOUS-CUTANÉS



GUIDE POUR LA MISE EN PLACE DE SESSIONS DE FORMATION

CONTEXTE

L'actualisation des recommandations de la SF2H relative à la prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés en 2019 a amené l'équipe du CPias Centre val de Loire et un groupe régional constitué d'hygiénistes de la région à prioriser cette thématique en 2020.

Les recommandations régionales relatives à la pose et la gestion des cathéters intra-vasculaires et sous-cutanés ont été actualisées (disponibles sur le site de la SPIADI (www.spiadi.fr) au niveau de l'onglet « fiches techniques » de la page « outils »), et un outil pédagogique a été élaboré à destination des hygiénistes, pour la formation des professionnels de santé.

CONTENU

L'outil pédagogique (diaporama animé et vidéo) met en scène Lily, une infirmière. Lily doit poser un cathéter veineux périphérique à son patient. Les étapes essentielles de la pose d'un cathéter veineux périphériques sont reprises afin d'éviter la survenue d'infections associées aux soins liées au dispositif :

- les 3 moments clés de l'hygiène des mains :
 - avant la préparation du matériel
 - juste avant d'enfiler les gants, immédiatement avant d'insérer le cathéter
 - immédiatement au retrait des gants

- la préparation du matériel :
 - un prolongateur pour éviter les manipulations au niveau de l'embase du cathéter
 - des gants pour se protéger en cas d'accident d'exposition au sang (AES)
 - un collecteur à OPCT à proximité pour éviter les AES

- la préparation cutanée :
 - le nettoyage de la peau si nécessaire
 - l'utilisation d'un antiseptique alcoolique (au moins 1 passage / séchage spontané)
 - l'utilisation de compresses stériles

- le port de gants pour l'insertion du cathéter
 - stériles si on repalpe le site alors que la préparation cutanée a été faite
 - non stériles si on ne repalpe pas avant l'insertion du cathéter

- la traçabilité du soin

- la surveillance au niveau local et général au moins 1 fois/équipe

- la réévaluation quotidienne de l'intérêt du maintien du cathéter


Sont rappelés les enjeux de la prévention des infections associées aux cathéters courts, ainsi que la part évitable importante de ces infections.

L'outil pédagogique contient :

- une animation sous la forme d'une vidéo



- ou d'un diaporama commenté à faire défiler par des « clicks »



- une affiche pour annoncer votre formation (date, lieu et QR code permettant d'accéder à la vidéo)



- Détection d'un besoin en formation dans un service de votre établissement

Par exemple

Dans le cadre de la surveillance des infections associées aux dispositifs invasifs, vous avez observé pour un ou plusieurs services de votre établissement un taux d'incidence élevé des bactériémies associées aux cathéters veineux périphériques.

- Proposition d'une formation portant sur la pose des cathéters veineux périphériques

Lors de la présentation des résultats de la surveillance aux professionnels dans un service, vous proposez au chef de service et au cadre de santé, de réaliser une formation auprès des professionnels de santé en charge de la pose et de l'utilisation des cathéters.

- Annonce de la date et du lieu de formation à l'aide de l'affiche

Après avoir planifié votre action avec les responsables du service, vous annoncez votre intervention en utilisant l'affiche, sur laquelle sont inscrits la date et le lieu de votre formation.

- Formation et Mode d'utilisation

Vous animez la séance de formation avec l'outil Lily comme support : la vidéo ou le diaporama animé est visionné puis débriefé par le groupe.

Lily peut aussi être utilisée en « libre-service » sous forme de vidéo. Pour cela, les participants doivent scanner le QR (sur l'affiche) avec leur mobile pour y avoir accès.

- Évaluation de la formation réalisée par l'hygiéniste

Mise en place d'un questionnaire ou d'un quiz afin d'évaluer la formation

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION À UTILISER

1) Dans 2 cas sur 3, les infections liées aux cathéters veineux périphériques courts sont évitables ?

Cocher la réponse exacte

Vrai Faux

2) A quel.s moment.s est-il recommandé d'effectuer une hygiène des mains lors de la pose d'un cathéter veineux périphérique court ?

Cocher la.les réponse.s exacte.s

- Avant la préparation du matériel
- À aucun moment car je porte des gants
- Juste avant d'enfiler les gants, immédiatement avant d'insérer le cathéter
- Immédiatement après le retrait des gants

3) Est-il recommandé d'utiliser un antiseptique alcoolique pour la pose d'un cathéter veineux périphérique court ?

Cocher la réponse exacte

Oui Non

4) Le respect du séchage spontané de l'antiseptique est indispensable pour une efficacité totale de celui-ci.

Cocher la réponse exacte

Vrai faux

5) A quelle fréquence, est-il recommandé de réévaluer le maintien du cathéter veineux périphérique court ?

Cocher la réponse exacte

Au moins 1 fois par jour Tous les 3 jours 1 fois/semaine

